

COVID-19 з гіпоксією

Показання до ендотрахеальної інтубації?

Так

Ні

Переносить кисневу терапію?

Так

Ні

Розгляньте: ⚠️ HFNC

Переносить
HFNC

Не переносить HFNC або HFNC не доступне

Так

Показання до ендотрахеальної інтубації?

Ні

Розгляньте: ⚠️ спроба НВПЛ

✓ **Зробіть:** уважно стежте у короткі інтервали

⊖ **Не треба:** відкладати інтубацію, якщо стало гірше

✓ **Зробіть:**

Уважно слідкуйте чи не погіршився стан

✓ **Зробіть:**

Тримайте рівень SpO_2 92-96%

✓ **Зробіть:**

Відповідний інфекційний контроль

⊖ **Не можна:** Відкладати інтубацію, якщо погіршився стан

✓ **Зробіть:**
Ендотрахеальну інтубацію

✓ **Зробіть:**
Перевірте дихальні шляхи перед інтубацією

✓ **Зробіть:**
Використовуйте N-95/FFP-2 або еквівалент для попередження інфікування

✓ **Зробіть:**
Мінімізуйте кількість персоналу у кімнаті

Розгляньте: ⚠️ якщо доступно

Відео-ларингоскопію